## 庫全書

子部

善忘不樂鴨溏口瘡耳枯皮焦天者死于冬 之則治逆之則亂反順為逆是謂失常病則生矣其候 夫心勞病者補脾氣以益之脾衰則感於心矣人逆夏 こうしき ここう 氣則手太陽不長而心氣內損順之則生逆之則死順 欽定四庫全書 普齊方巻十九 心臟門 心勞附論 告齊方 明 周王朱橚 撰

額肝丸 多定四库 生書 **膚漸覺羸瘦** 黄連素天靈益酯 灰今黄胡黄連衛肝如城龍甲击裙 機將胡出地 頭去 母 蘆貝母出心麻仁研杏仁湯浸去皮头雙 · 焙 天門冬出 西檳榔 生乾地黄品 治心勞熱角膈聚痰頭目微痛手足時煩 卷十九 **获神未紫苑去** 苗 機柴胡士也骨皮 百合 犀角屑 前胡 扣 Ħ 肌

フス りら これ 遠志散出聖 除寒熱利腰脚充肌膚益氣力 右為未煉蜜丸如梧桐子大每日食後温水下三 做 员去 汗牛膝击白茯苓 逐志法白术 丸夜卧再服 皮 天門冬去心 鼈甲 生乾地黄 石斛 治心虚勞損羸瘦四肢無力心神昏悶 人参頭 杜仲去租皮 微川 告番が 到好 黄耆川两用 裙欄各一两半甘草两金醋炙今黄去 甘草半 薯蕷 山茱萸 椒目去 肉 粨

新花湯 多定四月生書 右為散每服一 石擣篩每服五錢水一盞半煎八分去滓食後温服 桔梗 莉花 赤灸 剉殺 鯉魚莧菜等物 治心勞客熱毒氣上攻口中生瘡齒斷肉爛 甘草多多門冬居心生乾地黄后两 藁本去苗大黄炒栀子仁 錢以温酒調下空心及晚食前服忌 獨活或 防風太知母 黄芩去 前胡五產

貫泉九忠を 人参湯 · 1 等近 右撏篩每服五錢水一盏半生薑半分切煎八分去 滓食後温服 獨活去 蘆頭陳橘皮為浸去旋覆花而半 七黑枳殼去鄉木通,甘草野生地黄焙防風去人参 白茯苓皮 前胡頭 麥門冬姑心黄芩 治心勞煩悶虛滿貿膈痞塞飲食不下氣噎 治心勞熱傷心有長蟲一尺貫心為病 音虧を

| 欽定匹库全書 右為末煉蜜丸如梧桐子大每日空心用米飲下七 不留行湯 添 而 一 貫衆 九未瘥更加至二七九夜即再服以融下為度 根皮各一两半雷丸 方無石蠶有桃仁一 色 錢 画 陳橘皮 白殭蚕二七亂頭髮燒為灰白殭蚕二七亂頭髮如雞子 治憂愁思慮過傷心經古本腫强 白焙 一兩用苦酒下 白蕪美炒令 餞 西狼牙 ,大桃白皮 青箱子 置 黄

タミララ 犀角散 右攻咀如麻豆每服三錢生薑三片水一盞同煎七 志法桃花 犀角屑地骨皮西一真珠末 甘草各米两 雷丸 西熟 分去滓温服 王不留行 111 治心勞或風熱心神不安少得睡卧 桑根白皮半 延胡索 白芨 酸秦仁以黄耆当两川升麻 祖桔梗炒當歸知甘草 天雄皮臍 檳榔半

朱雀湯 多河四月全書 人参散 治心勞實熱多驚夢中恐畏不安 右細判拌匀每服三錢用水一盏煎六分去滓温服 右為散每服食後以温酒調下三錢 西甘草人两 雄雀内隻 亦小豆合亦茯苓去黑人参 大事 核紫石英 小麥各一遠志出紫苑去苗丹参各 兩一石膏一麥門冬去心始 治心氣勞傷 卷十九

麻黄湯 1 1 1 1 1 1 1 1 氣 右為散每服五錢以水一大益煎至六分去浑入竹 麻黄去根栀子仁 赤茯苓皮 白木 桂去粗 歷半合生地黄汁半合攬令习食後温服 神一兩栀子仁科 参班 蘆沙参山赤芍藥 一年角局 遠志法甘草矣微赤到石膏西次 治心勞煩多熱喜笑無度四肢煩熱止煩下 音新を 赤石脂

金定四库全書 竹站湯 治心勞潮熱肌瘦四肢煩疼 右擒飾每用樂末十錢雞子白一枚竹瀝半合水三 赤小豆合 蓋煎至二益去滓下芒硝一錢再上火令沸分作 貝母各三两桑根白皮对赤小豆两半柴胡去 三服空腹日午夜卧各一服 中尚者法黑石膏 甘草系在生乾地黄蜂五件生 前胡五蘆白茯苓去黑人参各一甘草

The lord little i 麥門冬丸 治心勞多驚悸心氣不足補心 右為末煉蜜和丸如梧桐子大每日食後夜卧時用 右擣篩每服二錢水一盞入生薑竹葉各五片煎至 桂去粗皮 車去升麻的一石菖蒲 人参 白茯苓去黑皮麥門冬去心遠志必熟乾地黄 天門冬去心黄 七 分不拘時去滓温服 門冬去心焙 許断を

遠志湯 多定四厚全書 黑或笑或歌 右搏篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後分 茯苓去黑黄芩去黑前胡去皮頭麥門冬去心始 遠志法犀角屑 芍藥的一人参 熟水下二十丸兼開心氣使人不忘 作二服如人行三五里再服 治心勢多煩躁背轉妨問面色數變下亦作 治勞熱精神不安喜忘不樂不能獨卧耳不 卷十九 知母将兩赤

101.00 DIED 1.1217 前胡麥門冬飲 治心勞客熟煩躁頭目昏眩 右捣篩每服五錢水一盞半生薑半分切赤小豆三 右為未煉蜜丸如梧桐子大每服三十九米飲下 **遠聽皮毛焦枯或言語錯亂** 前胡五蘆麥門冬去心養雞 元参 升麻 子仁冊各牡蠣是東內居各甘草兩一 白茯苓法黑白龍骨 遠志法防風法人参 射干 芍藥 甘草人西 普齊方

大黄散忠 多定四月 全書 從神散 惠方 右為散每服四錢水一中盡入淡竹葉二七片煎至 川大黄 微妙澤鴻 黄芩 羊角屑 甘草炒做木通川两石膏二 六分去浑食前温服尽炙烤熟麵生菓 十粒煎至八分去滓食後服 治心勞熱口瘡心煩腹滿小肠不利 **1** 治心勞實熱皮毛乾焦色無潤澤心神 卷十九 栀子仁 柴胡玉羚

た己り早んき 磁石散出聖 **病則耳枯燥而虚鳴不能聽遠** 右為散每服四錢水一蓋入竹茹一 磁石小画去汁赤茯苓 滓食後温服 犀角屑 赤石脂 8 不通 判川升麻 桂心 治心勞熱心氣通於腎開竅在耳若心 普濟方 菖蒲 甘草各半兩少麥門冬 遠志去心各麥門冬 木通 人参頭 跨主 赤石脂 分煎至六分去 遠志士心

世熱湯出三 多分四屆 全書 心満痛小腸熱 右為散每服四錢水一中盡入竹葉二七片煎至六 石剉散每服四錢水盞半煎七分食後服如熱盛者 澤鴻 膏八大黄蒸甘草、 分去浑每於食前温服 梔子仁 治心勞實熱口古生瘡大便閉溢不通 人 炙 各 卷十九 黄芩品三桂心 一両 通草格二石

遠志飲子集成方 黄芩湯出永類 右叹咀每服四錢水一盏半薑五片煎至八分去淳 私] 地黄 澤鴻 温服不拘時 煎熟加芒硝一 栀子仁 黄連去甘草矣各 治心勞實熱口瘡心煩腹滿小便不 | 錢煎 不以時一方加大豪二十枚 治心勞虛寒驚悸恍惚多忘不 黄芩 麥門冬丛木通 生乾

欠正日華八馬

普斎方

磁石湯 金好口匠 白書 右吹咀每服四錢水一盏半薑五片煎七分去滓温 服不拘時 磁石坑今通赤醋亦茯苓去黑大青 遠志去心甘於神去桂心不見酸素仁效 人 黄者其當歸去益頭酒甘草衣半 菖蒲 治心勞熱耳焦多鳴不能聽遠 芍藥各十赤石脂一

九三日日上上日 · 赤芍藥丸 急小便淋瀝白濁疼痛 右為末煉蜜九梧桐子大每日食後温水下三十 右擣篩每五錢水一盞半入竹葉五片煎至一盞去 浑分作二服空腹夜卧服 夜卧再服 心 出施子仁 車前子炒瞿麥穗各 赤芍藥 大黄炒冬葵子一兩半 告参两黄 治心臟勞熱义積毒氣小腸氣癃結少腹 普齊方 +

石膏飲子出聖 多而傷血血傷即不欲視聽心煩驚悸 右細到和勺每服半两水一大鍾煎至五分去浑入 董竹憑半合更煎一沸不計時温服 石膏四两次神 平 生地黄为三甘草带和泉赤小豆一 惠方 治心勞因多言喜樂過度傷心或愁憂思慮 木通一麥門冬一 两半 茯神太百合 治心勞實好笑四肢煩熱 屑角屑 川芒硝兩

フィンフラー こう 麥門冬飲 治心虚勞損喜忘不樂 右搏篩每五錢用水一盏半入棗三枚擘煎至 右判如麻豆每服五錢水一盏半煎八分去滓温服 柴胡士苗各龍茜一兩 錢防風土赤芍藥和半陳橘皮過浸去白 麥門冬去心白茯苓二兩半 人参兩遠志去心 去浑分作二服食後相次服之 一兩 普齊方 一盏

一致定匹库全書 小定心湯出三 麥門冬湯 地黄湯 治心勞實熱口瘡心煩多笑少力小便不利 右搏篩每服三錢水一盞入竹葉二七片同煎六分 魔神志不定方見本門 怔 生乾地黄始柴胡去商各香品栀子仁錢亦小 去浑温服不拘時 豆由二木通鲜三 治心勞熱不止皮毛焦色無潤澤口古乾 No. 治心勞虚寒驚悸恍惚多忘夢寐驚 卷十九

, こうし ここ ,黄浅熱湯 通心満痛小腸熱 右以水五盏先煮米并竹葉取三盏去滓澄清冷下 燥心中煩悶 雞子白再煎五七沸即下麥門冬煎一盏半去滓 雞子和的陳果米白淡竹葉切在麥門冬去心 分作三服空心日午卧服 人黄 澤鴻 治心勞熟口為生瘡大便苦難閉溢不 黄芩 音断方 芒硝 栀子仁兩三桂心

保真散出該 **郵定四庫全書** 無滋味小便或赤或白忽多忽少即宜先吃去腎形 必先傳其所勝賢病之極即傳之與心心既受勞即 五心煩燥唇口乾精神不足恍惚健忘少喜多嗔口 右攻咀用水九升先以水一升别漬大黄一宿餘八 滓下芒硝令烊分三服 升水煮諸藥取二升五合去滓下大黄煮兩沸去 通草 石膏的甘草和大聚二十 治一切男女人心受勞氣夫五行受病

災王四軍全書 東 右納杵羅為未每一錢水一蓋煎取八分食後去淳 服此去火毒 方漸吃清心臟鮮邪氣樂也若病症已傳在心即宜 冬去杏仁去头雙次苓 官桂 荆芥穗分一麻柴胡玉貝母法天靈益酷炎黄鼈甲醋兔麥門 黄姚 黄芩 沉香 木香絲二牡丹皮法前胡去桔梗 服須是大腑熱脉氣數有骨力方可吃 普斯方 +

治心受勞氣不是熱蒸只是虚勞乍寒乍熱忽時面上 金ダルガイラ 渾身泛熱忽時足冷如雪非時乾嗽忽時咯出痰中 不急治之變成大病出腹 有血忽時一吐血大腑如常不冷亦不熱脉氣浮數 柴胡玉鼈甲熊內豆蔻去白正 秦充 黃香 官桂皮 桔梗 荆芥西半麥門冬七當歸 人参 枳殼計用甘草 乾地黄 海桐皮 酸素仁炒谷沉香

文王四事人HAIT 烧肝散出家藏 右同為末用頹猪肝薄批去血水粉藥在上勺徧以 石杵羅細末每服二錢水 荷葉裹定濕紙包之慢火煨令過熟空心食前米 飲下此樂有奇功 各一兩 蒼术 銀州柴胡去蘆白木 食後吃若是已發數脉氣有骨力可吃此藥也 治久年不瘥心勞口瘡 普濟方 黑附子皮脐石斛去浮膜三 紅芍藥 **盏生薑一片同煎九分** 牡丹皮 十四

謂風客溫氣精乃亡邪傷肝者如此其症筋脉燥急相 故筋脉和柔令風客於腎病蟲出白則精己虧矣經 肉 金岁已后人里 精屬腎筋屬肝脉屬心精盛則滋育諸筋榮灌諸脉 從替九 經謂病盡弗治腎傳之心筋脉相引而急病名曰與 而與是也 瘈病 治瘈病筋脉相引及五勞七傷小便數 附論

とこの見に言 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心日午 疼久立不得坐即脚痺肚腹不安 茯苓去黑石斛去鹿茸品天蛇床子 五味子 肉從蓉酒浸山半 **卧温酒下** 逐志法續斷 杜仲去粗皮澤鴻 普済方 桂去租附子皮虧去甘草 覆盆子 兩各

牛髓九出十 多分四届 有量 右除前四味外擠羅為末先與豪肉相和次入牛 酥蜜欖勺內銀石器中重湯煮之作丸如梧桐子 义 細辛各半兩白术二錢 兩乾薑此生乾地黄此路人参 冬去心芎藭 牛髓研白蜜 大每服三十九加至四十九酒下日丹 治與病及虚羸等疾 酥 桂去覆當婦出草到羌活頭各 超十 東肉 ì. 白茯苓皮黑麥門 五味子 防風

久已日事 LEMIS !! 五味子丸 焦客熟健忘心忪 石擣末煉蜜和入真酥五兩再擣丸如梧桐子大每 切焙澤鴻 赤石脂 服二十九至三十九空心日午温酒下 志法相子仁格二 五味子半 治與病筋脉相引補虚損去原臟久冷上 一 熟乾地黄焙肉從蓉酒浸切焙牛 山茱萸 竟然子别持白茯苓去 黑巴戟天去 普濟方 杜仲去麗山子 ナバ

建中湯明論 金グロると 右撏篩每服五錢用水一盞半生薑三片棗二枚擘 便數腹痛難立 夜 黄四两附子皮縣 厚朴六年各一两 兩 破煎一盏去滓入飴糖少許再煎敷沸温服日二 人参 甘草钱亦桂去粗白茯苓去黑當歸切烙 黄耆 龍骨 麥門冬去心婦巧樂 治瘈病筋脉相引而急及五勞七傷小 卷十

萬金丸 た正の日人には、普洛方 茯苓鍾乳九 焦傷竭不足 右為未煉蜜九如梧桐子大每服三十九空心酒下 熟地黄品十天門冬去心始巨勝子站五雨白 五味子各一熟乾地黄焙乾絲子酒浸别持 鍾乳粉六牛膝切好內從容切好人参 石斛去白茯苓皮其黄耆 却积殼去鄭蛇床子兩一煉成 治爽病筋脉相引 治與病筋脉相引通百節利九竅補下

金 足口匠 台書 石菖蒲丸 右為末煮棗內與熟蜜和檮三十杵丸如梧桐子大 子兩二桂 後酸聚仁妙甘草 則巴戟天去心各茯苓及黑甘莉花兩三肉從蓉切焙牛膝切焙山 苓去黑地骨皮 生乾地黄焰竟終子酒浸别 每服三十九至四十九空心日午温酒下 石菖蒲 牛膝酒浸一宿焙速志以人参 治與病筋脉相引强筋力滋血脉 白茯

又曰以夏遇病為脉痺脉痺不已復感於形內舍於心 亦色凡脉氣表血焦髮墮以夏丙丁日得之於傷風損 凡脉極者主心者也心應脉脉與心合心有病從脉起 脉為心風心風之狀多汗惡風若脉氣實則熱熱則傷 則飲食不進肌膚瘦損血色白不澤其脉空虚口唇見 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心日午 夜卧温酒下 脉極附論

人已日年公前

普濟方

皮毛肌膚筋脉則全治之若至六腑五臟則半死矣脉 經脉病治陰絡陰絡病治陽經定其血氣各守其鄉 手少陰手少陰氣絕 則脉不通血先死矣 實宜寫氣虚宜補善治病者定其虚實治之取痊病 喉中介介如哽甚則咽腫喉痺故曰心風虚實候若陽 澤飲食不為肌膚若脉氣虚虚則寒寒則欬欬則心痛 心使人好怒口唇色赤甚則言語不快血脫色乾燥 不治三日死何以知之脉氣空虚則頗焦髮落脉應

金艺口屋台雪


沙芝四事 全雪 生地黄煎出干 右㕮咀以水一斗二升煮二升七合去滓下地黄汁 飲食不為肌膚消熱止極絕胃氣 白木兩二石膏一生姜雞四 速志二甘草和人参 茯苓 生地黄汁 赤蜜 生麥門冬科一萬心一升 及蜜更煎取三升五合分四服 No. 治脉熱極則血氣脫色白乾燥不澤 普濟方 乾地黄 芍藥 九九

麻黄湯 生えでし 消虚热極止汗 右擠篩每五錢用水一盞半入棗三枚擘煎一盞去 浑温分二服早晚食後各 皮防風去紫苑去苗土各升麻 麻黄去根杏仁熊仁各二两 栀子仁 参兩一石膏 具桑根白皮料 治脉極熱傷風損脉為心風狀多汗無滋 治脉極致言語不快精神恍惚脉虚驚 桂去羅從神 展 黄 本 黒去

淡足四車全馬 夏湯 跳不定 四腫喉痺止痛益氣 右為散入研了藥同研令勺每服煎竹站湯調下 錢不計時服 志半 丽羚羊角屑畔 参 蓋 著 預 治脉極虚寒致嗽心痛喉中介介如鯁甚 牛黄一分麥門冬去 普濟方 鐵粉 生乾地黄 心焙麝香細研速 酸聚仁 Ŧ 戼

補虚九一名人参九 石到如麻豆每侵工意了, 為年業 附子泡黎去乾 當歸切始各十草好到桂去產 當歸切始各十草好到桂去產 虚安神 右對如麻豆每服五錢用水一盏半入生薑一東大 拍碎煎一盏去滓温分二服早晚食後各 参蘆麥門冬培心黃耆炒甘草焰石菖蒲 治脉極驚悸乍安午發宜服補 卷十九 次定四軍在書 图 鎮心在思理 右掛研極細囊肉丸如梧桐子大每服十九空心前 右為末煉蜜和九如梧桐子大每服十九米飲一 五味子炒 **片研** 五 研龍腦一兩虎睛好一號拍餅一金箔研五銀丹砂研鐵粉研遠志法人参两半花神士林牛 一兩防風人遠志心附子皮縣一白茯苓皮 治脉極驚悸安五臟鎮心神煩滿恐畏 普濟方 金箔研五銀箔 丰

石膏散出聖 サプルガルニー 煩 石為散每服四錢以一種水煎至六分去率不計時一一桂心分麥門冬去心 温服 石膏和栀子仁 金銀湯下一方煉蜜和丸忌羊血 人参班 盛縣根白皮對杏仁為沒去皮失雙兩梔子仁 黄耆對防風班 犀角角 茯 治脉極傷風損於心氣多汗無潤澤虚 卷十 かんとりありとはる でん 麥門冬湯出醫方 治症同前 地黄湯出三 甚則言語不快色不澤飲食不為肌膚 右對散每服四錢水一盏半煎七分去淖不計時服 获神去石膏州各甘草於半 麥門冬江遠志並然甘人参 黄芩 生地黄洗 兩甘草兩一白术兩麥門冬去生地黄五兩 人参 茯苓 芍藥兩二菱雜四石膏六速志去 治脉實極氣衰血焦髮落好怒唇舌 普濟方



为三日草 E 升麻湯出聖 茯苓湯 右搖篩每五錢用水一盞半入竹葉五片煎一盞去 言語不快消熱氣調血脉理中 淳下芒硝一錢七分温二服早食後日午各 麻 紫苑去当土麥門冬去心焙或炒一石膏亦茯苓皮里黄芩法里栀子仁兩半赤石脂, 方有生地黄 治脉極實熱血氣傷心好生嗔怒口唇色變 治脉極熱遇風痺感心血脱面色白不 普齊方 Ŧ

人参散 金少匹左石雪 驚 不定 潤澤脉空虚口唇色乾潤色消痺止熱 右搖篩每服五錢用水一盞半入生薑一棗大拍碎 竹葉五片煎一盏去滓温服早晚食後各一一方 有犀角屑 門冬去心養鞋各二生乾地黃船三甘草一两 治脉極好忘言語錯亂精神不守肩臂痛虚 射干 芎藭 人参西半赤小豆青合麥 卷十九 次已日華在馬 茯苓散患方 右為散每三錢以水一中盞入淡竹葉二七片豉五 **褻赤語澁不快調脉理中** 研為散每服二錢水煎淡竹站湯放冷調下 赤茯苓 心蛇黄焼醋羚羊角鳑酸豪仁等 人参頭 蘆遠志法犀角屑兩一石膏四 赤茯苓は • 赤石脂 治脉極實熱血氣傷心好生嗔怒口色 普濟方 麥門冬去心時黃芩 一鐵粉 麝香研家 二十四

茯神湯 金少口戶人可 柘業沐頭九 右㕮咀每服四錢水一盏半薑五片煎七分去淖温 咽腫驚悸不安 茂盡桔梗去蘆甘草炙各 淡声去点甘 服不拘時 **丁粒煎至六分去滓食後温服** 治脉虚極效則心痛喉中介介如鯁狀甚則 治脉極虚寒鬢髮墮落 卷十 通草 麥門冬法黄

欠巴口巨八三 桑栢皮沐頭方 治脉極虚寒鬢髮隨落方 右以米泔一斗煮五六沸去滓沫頭則鬢髮不落而 右將柏葉附子為末煉猪膏和為二十九每用布 麻子研二白桐葉一把 生柏葉一附子經半兩猪膏五 **九内米頭湯中洗頭令髮長不落** 治脉極虚寒鬢髮堕落 普涵方 主

金分四屆 全書 普済方巻十九 用桑根白皮到二斤以水浸漬一宿煮五六沸去滓 **济髮數為之佳** 

子部

普濟方卷二十

詳校官太醫院見禮 表天錫

編修臣倉聖服覆勘 總校官原任中允臣王 燕緒

校對官中書臣鮑之種 勝録監生臣范廷舜

THE STATE OF THE S CONTRACTOR CONTRACTOR のではない ないのはない 也中唇者脾之官脾氣通於口利 THE PERSON NAMED IN 哲祭な 慕謂之慮因處而處物 存意之志也為諫議大 )意意之所存謂之志 周王朱楠 撰

足得其時則夢祭垣盖屋牌氣盛則夢歌樂體重手足 脾臟營營含意在氣為噫在液為延脾氣虚則四肢不 温五臟神明胖胖主臟管秩禄號為意藏随節應故曰 脾重二斤三兩扁廣三寸長五寸有散膏半斤主裹血 出順頻次候於唇下迴脾中榮華於舌外主肉內主味 則能變五穀味矣故云口為戊舌唇為已循還中宫上 不舉厥氣客于脾則夢丘陵大澤壞物風雨凡脾臟象 五臟不安實則腹脹溺溲不利脾氣虚則夢食飲不

**鉛定匹庫全書** 

薰遂棄具母逃於水中為金子而藏火神閉門塞戶內 こうにいい 陰緩而遲尺寸不同酸鹹苦辛大繆而生五行其時而 蠕動蚊蠷喘息皆蒙土思德則為緩思則為遲故令太 同故名曰得福者廣萬物緣根住莖其葉在顏凡明蜚 夏王於季夏脾者土也敦而福敦者厚也萬象衆色不 以各行皆不羣行盡可常服土寒則温土熱則凉土有 一子名之曰金懷挟抱之不離其身金乃畏火恐熱來 土與胃合為腑其脛足太陰與陽明為表其脉緩相于 治所方

氣虛脾空胃遂居之肺為喘浮肝反畏肺故下沉沒下有 其味為醎倚生母敗污臭如星土得其子即成為山金 水道甘液下流停其陰陽喘息則微汗出正流肝著其 荆棘恐傷其身避在一邊以為水流心衰則伏肝微則 地走繁皮膚面目浮腫歸于四肢愚醫見水真往下之 外不通此謂冬時土失其子其氣衰微水為洋溢浸漬其 根心氣因起陽行四肢肺氣亭亭喘息則安腎為安聲 沈故令脉伏而沈上醫遠占因轉孔穴利其溲便遂通

鳥之啄者此謂不及病在中太過則令人四肢沈重不 得見惡者何如其來如水之流者此謂太過病在外如 得其母名曰丘矣〇四時之序逆順之變異也然脾脉 たこうき ここう 数如鷄舉足曰脾病脾脉来堅銳如鷄之啄如鳥之 如屋之漏如水之流曰脾死○真脾脉至弱而乍踈 相離如鶏践地曰平長夏以胃為本牌脉来實而盈 不及則令人九竅壅塞不通名曰重強胖脉来而 何主脾脉者土也孤藏以灌四傍者也其善者不 Ų 普添か 跸 7日

藏浮之人緣 按之中如覆杯潔潔狀如摇者死六月季 满而唇反唇反者向先死甲篤乙死木勝土也〇 脾 胃少曰脾病但代無胃曰死濡弱有石者冬病石甚曰 散色黄青不澤毛折乃死○長夏胃微濡弱曰平弱多 夏建未也坤未之間土之位牌王之時其脉太阿阿 口唇者肌肉之本也脉弗管則肌肉濡肌肉濡則人中 肢不舉毛瘁色天死于春〇足太陰氣絕則脉不管其 今病脾臟營營舎意愁憂不解則傷意意傷則問亂四

金云四月白書

欠己可見公言 足太陰治陰〇脾脉長長而弱来疎去緩再至曰平 手關上陰實者脾實也若腹中伏伏如堅狀大便難 少氣下利腹滿身重四肢不舉善嘔刺足陽明治陽右 土為微邪雖病即瘥○右手關上陰絕者無脾脉也若 大逆十死不治反得沉濡而滑者是腎之寒脾水之陵 緩日平反得浮大而洪者是心之東脾母之歸子為虚 病自愈反得弦而長者是肝之乗脾木之対土為賊邪 犯雖病易治反得微潘而短者是肺之乗母為 塞那雖 普齊方 刺

也〇胖脉急甚為瘛瘲微急為膈中淌飲食入而還 金好四周台書 無疾大甚為緊仆微大為脾疝氣裏大膿血在腸胃之 至日離經病四至日脱精五至死六至命盡足太陰脉 而長其色黄當病少氣其更而散色不澤者當病足肝 腫若水伏)黄脉之至也大而虚有積氣在腹中有 腸鳴熱濇甚腸癩微濇為內清多下膿血脾脉搏 小甚為寒熱做小為消庫滑甚為癩務微滑為蟲毒 沃沫緩甚為痿厥微緩為風痿四肢不用心惠然若 出 堅

欠三可臣 二十 塞不通身痛體重一日之胃而腹脹二日之腎少腹腰 骨痰痿厥精時自下則病精是故五臟主藏精者也 變動為噫在上心為思思傷脾精氣并干脾則飢應在 注利其實若陽氣壮則要飲食之類〇牌在聲為歌在 氣名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風〇扁 可傷傷則守失而陰虚至無氣則死〇病先 發于脾閉 長夏病變於音者取之經恐懼而不解則傷精精傷 曰脾有病則色養黃實則舌本强直虚則多癖善吞 普濟方

不接 収足 果實得之不者當以春時發得病于甲乙日也口 其經足太陰陽明少陰血者○脾脉沈之而濡浮之 病 虚若腹脹煩淌胃中有熱不嗜食食而不化大便難 脊痛脛痰三日膀胱背脊筋痛小便閉十日不已死 人定夏晏食〇病 之狀必身重善飢足痿不收素問作善肌肉疾足 冏 ○行善瘈脚下痛虚則腹淌腸鳴飧泄食不化 時日 者出 終甚 心假令脾病東行若食雞兎肉及諸 在脾日映惠平且甚日中時下明 九 冬 而 取 胛 作不

多好四月全書

卷二十

公孫秋剌商丘皆補之又當灸張門五十肚背弟十一 **若醉飽入房汗出當風則傷脾脾傷則中氣陰陽離** 中善飢防氣不足則有寒有熱皆調其三里有所擊 椎百肚〇邪在脾胃肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱 湯春當刺隐白冬剌陰陵泉皆寫之夏刺大都季夏剌 微緩而長此為可治宜服平胃丸瀉脾丸茱萸丸附子 其色黄飲食不消腹若脹滿體重即痛大便不利其脉 肢若瘅時不仁得之房內日使不来来而頻併○脾病

大三日里台

香野方

金分口四百言 脇抢急○跌陽脉浮而湿浮即胃氣微澀即脾氣衰微 弦 四肢急體重不能衣跌陽脉浮而漩浮則胃氣強漩 四肢苦重津液不生但苦少氣小便難〇 從故陰以三分後死生〇脚中風者翕發熱形 則為痛消則為寔即為急寔即為踊痛 人腹中煩重皮肉潤 脾氣弱或五液注下青黄赤白黑○寸口脉 便数浮溢作 相搏大便則堅不能更衣汗出不 而短氣也〇脚水者其人腹 踊 牌服者善噦 相搏 弦 即 止 而 滑 名 胸 引] 女口

氣必强○跌陽脉滑而緊滑即胃氣臭緊則脾氣傷 **遲則為陰營氣促營衛俱和剛柔相得三焦相得承其** 徴 即 食而不消者此脾不治也能食而腹不淌此為胃氣 不通為秘塞之病○寸口脉緩而遲緩則為陽衛氣長 入其氣不出無表有裏心下痞堅〇跌陽脉微而濇微 衰相搏即呼吸不得為脾家失度○寸口脉雙緊即 牌傷穀氣不行食已自噫寒在貿馬上虚下建穀氣 無胃氣濇則傷脾寒在于膈而反下之寒積不消胃 有

次已四華私馬

9

普声方

愈〇 安而强與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩 脾先落○凡人病脉已解而反致微煩者人見病者差 先病微燥而渴者可治不渴者不可治臍反出者此 者病發雞後黑者有熱青者有寒白者不治唇黑者 食而淌者此為脾家不治病人鼻下平者胃病也做 餘腹滿而不能食心下如飢此胃氣不行心氣虚也 ,診得脾積脉浮大而長飢見順起與穀争减心 如桃李起見於外腹潘嘔泄腸鳴四肢重足腔 損穀 為 腫 得 則] 赤

金少口

温力量

舉體消瘦語音沈澀如破鼓之聲舌强不轉而好咽睡 不通陰陽翻祥陽氣內繁陰氣外傷則寒寒則虚虚 是木之尅土為大逆十死不治〇宫音人者主脾聲也 澳直視唇 及張 作甲青飲食吐逆體重即痛四肢不舉 口禁唇黑四肢不舉身重如山便利無度甚者不可治 脾聲歌其音鼓其志愁其經足太陰厥逆陽明則榮衛 其脉當浮大而緩令反弦急其色當黄而反青色者此 厥不能以是主肌肉損色黄也〇 牌病其色黄體青失

欠已日日本

哲濟方

多肉上下相稱行安地舉足心平好利人不喜權勢 肉黄如組版者吉牌主口唇屑是脾之餘其人土形 甚則不可治若唇雖萎黄語音若轉可治黄為脾脾合 陽繁陰陰氣伏陽氣起起則實實則熟熟則問亂體 比於上宫黄色大頭圓面美肩背大腹好腹胎小手足 不能轉側則語聲拖聲氣深不轉而急此為邪熱傷 依源麻黄湯主之又言聲憂懼舌本卷縮此是木尅 (耐秋冬不耐春夏春夏感而生病主 足太陰敦 重 相

一多好工屋 有電

欠二可見 ここう 必有病主胃陽明為脾之部而藏氣通于內外部亦應 **薄無腭斷屑缺此人脾不正揭鋒屑者則脾髙高則實** 而随之沈濁於內浮清於外若表病外入所部則起 則臟安安則不病骨上下好者則脾端正端正則 虚虚則危危則寒而身重不能行步唇堅者則脾堅堅 實則熱熱則季脇痛湍唇垂而大不堅者則脾下下則 然脾應日月有虧盈脾小大随人脣大小上脣厚下脣 利人無病唇偏舉者則脾偏痛好脹凡人分部中陷 普齊方 胛 胃

青 則前 墓色應之必死不治看色厚薄決判除促除則不盈 生体否則藏神前變形於外人脾前病唇則焦枯無潤 百日内促則旬朔之間脾病必愈而卒死何以治之 陰後治陽陽則寒熟陰則虚寒寒主外熱主內凡人 何以治之曰冷足腫腹熱臚脹泄利不覺其出時面 脾前死骨則乾青白漸縮急齒噤不開若夫中等 為陽後補陰若裏病內出所部則陷陷則前 拇指厭黑點見顏頰上此必卒死脾絕十二日 四 日 死 治

多分四月全書

文と日年から 與舌本中封在內踝前一寸大筋裏究中脉本從中封 足太陰脉也其脉本在中封前上四寸之中應在背 年上不應三年之內禍必應也〇季夏土牌脉色黄主 霏而見黑黃入唇必死不出其年根是其分部位也若 上四寸是也其脉根于隐白在足大指端内側是也〇 復愈欲起榜徨因坐於地其亡倚林能治此者可謂良 又面黄目亦不死黄如枳寔死吉出之色在於分部霏 青目黄者五日死病人著狀心痛氣短脾竭內傷百日 再断方

調 治丹毒四時隨病當依源補為虚建之疴皮內随熱 氣內伏其病相反若腑虚則陰邪所以頭重頭直皮內 随病也其源從太陰陽明相格節氣相移三焦寒温 毒熱於皮膚分向之中上散入髮際下胃顳顬隱隱 强痺若臟實則陽疫所傷蘊而結核起於喉頭之 四季之月各餘十八日此為四季之餘日主脾胃黄內 四時閥格而起則職腑傷疴随時受寫陽氣外泄 相斷離故曰黃內隨病也〇又云灸肝脾二輪 側 陰 而 不

金发巴屋

石草

實之候 淌不得安以夢見歌樂四肢怠惰診其脉緊夏者是脾 熱頰疼體重不能轉倒足寒頸熱聲沈而心急咽喉 大巴日草 上馬 不利古本腫强口內生瘡言語審難涇溲不利腹脇 須鎌破薄貼方灸足治疾病無逃矣 夫脾實則生熱熱則陽氣勝而心骨煩悶唇口乾焦身 脾實熱 力 昔南方 痛 脹

金公口及台書 治脾熱偏一邊痛自湍脇偏脹出升 治脾熱面黄目亦季脇痛湍 右攻咀水九升煮三升去浑下芒硝分三服 茯苓 硝 半夏 淡竹葉る **两各** 三 橘皮 F 桂心的一石膏的半夏的生薑切 細辛 母薑的八枳實 It to 兩白术 澤寫西三芍藥 巷ニナ 金出方干 杏仁的 梔子 凹 生地黄 白术 茯苓 쏜 맫

清脾湯 てこる えんごう 右㕮咀以水一斗二升煮三升去滓分三服若湏 得队舌本强體重面黄頭痛右脇 乾唇裂寒熱如瘴 下加芒硝二两佳 桑白皮根 大出 桂 方 檑 رت. ا 皮 一 升 治脾實熱病足寒頸腹脹淌煩擾 白芷 草葉去白水 告解す 甘草戏川芎 錢各 淌 痛 偏 脹口 洗三七錢 苦 次湯 利 咽 不

多定四库全書 清脾湯 右各等分散每四錢水一益半薑五片棗二枚小麦 右對散每四錢用水二盏薑七片紫蘇三葉同煎七分 用 去滓服欲通利加大黄畧煎 三十粒煎七分去滓不拘時服 半夏洗七 香臼芷 治憂思過度蘊熱於脾口乾唇燥潘裂無色 黄耆 升麻 卷二十 人参 甘草

たこうえ こう 大黄湯虫型 咽喉不利 右㕮咀水九升煮三升分三服食後服 前 胡 **一剉** 两炒 去黑心 茯苓 治舌本強直或憂歌樂而體重不能 治脾實育中滿問腹脇壅脹身 龍膽草 哲解方 淄 一去两心 苦竹葉 皮 枳殼 細辛 滑焙前 榱 丙麸 甘草 胡 圭 各三 去蘆 泛 杏 两頸 剉

金好四月全書 瀉脾赤茯苓湯此 煎七分不拘時温服 右粗搗篩每服三錢鹽水一盏生薑一片大棗 右粗捣篩每服三錢鹽水一盏生薑|棗大煎七分 不思飲食 甘草 桑白皮三分 赤茯苓三分旋覆花半两大黄微炒 半两 7 芍藥亦者 枳 良 去 粮 麸 す聖 治脾實熱頭痛胃淌腹脇壅滞 石膏两各 前胡 去蘆

こうし 前胡飲出生 右搗篩每服三錢鹽水一盏生姜一棗大拍碎棗 枚煎七分去滓不拘時服 不拘時候温服 膈壅滞不思飲食 积散社 前胡七篇大腹皮一致赤芍藥 桔 便当以羚羊角角 半裸 内麸 治脾氣實四肢不利頭重目疼妨問心 d.Y 音をす 旋覆花 赤茯苓士皮 甘草

一致定匹庫全書 鴻脾升麻湯 羚羊角九忠す 右捣羅為末煉蜜和丸梧桐子大每服食前温水 二十九 大小便不利 榔 黄 羚羊角屑 做少 木通 一两桑白皮一 恵出方聖 两 治脾氣實心腹壅滞痛悶兩脇 枳殼 治脾臟壅實口内生瘡食少心煩 丹 两大麻仁一两. 巻イナナ 做黄去 到 粮炒前 胡灌珀去 赤茯苓丰西 脹 棺 淌

ここうとしこう 石膏湯忠す 燥 服 右粗搗節每服三錢鹽水一盏煎七分去滓食後温 菱根 石膏 柴胡去苗一 方有黄本忌炙傳熱麺 两麦門冬士心始柴胡士苗犀角 地骨皮西 治脾實熱頭疼脇満煩悶或渴唇口乾 羚羊角屑 麦門冬去心大青三分 甘草或半 きらら 葛根丰西甘草文半两 茯苓去木 黄連 1 去鬚各 两 括

馮脾湯 後温服 右切以水七升黄取三升分為三服又主冷氣在牌 職走出四肢手足流腫亦逐水氣冷忌海藻菘菜羊 去滓入蜜半合生地黄汁一合攪令匀更煎两沸食 右搗篩每服三錢鹽水一盏入竹葉二七片煎七分 茯苓 桂心五两生薑八两半夏一升 主脾臟病氣實育中淌不能食 厚朴及各甘草次 人参 黄芩西二

一到定匹库全書

灭

卷十二十二

射干煎生力 檳榔九 肉湯生葱酢等物 九利下為度 右捣羅為末煉蜜丸如梧桐子每日空心米飲下十 射干八两大青三两 檳榔 剉炒各 治脾實肠腹鼓脹涇洩不利 木香 治舌本强直或夢歌樂而體重不能行 芍藥 石膏作一升赤蜜一升 枳殼 三蔟分麸 #Y 桂 皮去 粗

| 欽定匹庫全書 治脾熱脅痛熱滿不歇目亦不止口唇乾裂出力 服 右㕮咀水五升煮一升五合去浑下蜜煎二升分三 膏取一升五合去滓下地黄汁两沸次下審煎三升 右先以水一斗二升煮竹葉取七升去滓澄清奏石 細服之 石膏一斤生地黄汁 若赤黑發如瓜大用煎羊脂摩之 卷き 二月 赤蜜母一淡竹葉切五 升

麥門冬煎金才 柴胡升麻湯 主脚氣實其人口中痰泔以情情痛無常處嘔吐反胃 用大黄六两以水六升煮取一升分再服之又主食 服忌海藻菘菜 即吐并大便不通者加甘草二两取二升半分為三 方 用赤小豆木和鶏子白傅之 治四肢發熱方見心臟門心煩熱類 治脾臟壅實心胃煩悶唇口乾燥渴 音符了 +

秋不止 ヵ見 本 一致定匹庫全書 ■ 治脾職積熱中焦氣膈唇皮焦絕音中氣淌氣昏并口 内生涎大腹實熱 右 分食後和滓服 細杵羅為末每服二錢水一盏生薑一片同煎取 枳 大黄丸荆芥穗 ·設 青 用 脾痛 麻黄怯 19 防風 巻-1 二月 十フ 枯 梗 杏仁 川芎 各等 羌 活 訶子

参术散 脾痛氣痛方直指す 蛤粉六錢併服 右對散每服三錢水大蓋煎八分入鷄舌香散二錢 右等分對散每服三錢薑三片煎取樂汁調炒過真 良薑 人参 白术女 乾薑地白豆蔻 橘皮 甘草製 陳皮 治虚弱人脾痛 丁香 石菖蒲 甘草炙各 丁香 縮砂

欽定四庫全書 木香神效散味氏集 至七分空心服臨熟加鹽一捻再煎兩沸是麵食豆 再煎少頃濾清汁服之 右㕮咀每服三錢水一盏半生薑三片囊兒一枚煎 丁香纸 川白芷 肉桂皮女胡索 破故紙終半華澄茄三稜 蓬莪术 神麴以甘草災私三白芍藥 南木香 青皮 陳皮 麥藥子炒大枳殼炒神效散來氏集 治遠年近日一切脾痛 N. 荆

治脾痛方 右為末醋 間 要用 屡效難以具述 腐 血 云自感此疾以来遇食冷物或天氣寒冷便發則胷 氣醋湯下產後氣痛艾湯下五九食酒傷隨物 點痛起或引入背齊痛不可忍服之遂絕根源 切生冷此方得之鄉里蕭國賢國賢得之川僧 大出战醫 糊九如菉豆大每服十九生薑湯下婦 す 杏仁炒黄丸 牵 各半两 黄 陳皮 两 黄 白

|飲定四庫全書 八珍散县处方 胡 湯下遇發時服甚者不過二三服效 极九大战 **塩湯下** 右為末醋糊丸如梧桐子大每服二十九用温酒 小兒驚熱疳疾飯湯下蛔蟲腹痛史君子七枚為末 陳茱萸二两 白豆兔仁母 治脾疼不進飲食 楜 治脾疼不可忍療冷氣疼 石蓮向心妙白茯苓炒 椒 蚌粉炒赤色 十九 沉香 塩

てこうし 治脾元氣發無時痛不可忍大威 右和炒令焦黑為度去菜英取桃仁去皮尖研細葱 門人之属進此藥而愈 白三莖煨熱嚼酒調下分三次 用紙隔藥炒勿令傷力胡石壁為軍器監得此疾得 右㕮咀每服六錢重水二盏薑五片煎八分去滓服 茱萸 111 白扁豆蒸 桃仁各一两 哲断か 陳皮為一甘草

1良薑お痛散出醫女 一多定四庫全書 治脾疼久藥不效方 用大川鳥頭一枚重三四錢炮熟去皮臍為末白髮 **茱萸黑為末每服一錢重温米飲調空心服** 畔當日壁土須無兩處者同炒次以米醋拌同炒吳 用良薑切作大片先用吳茱萸慢火炒少頃次入東 熟入蜜少許連湯作點心喫三次效 一茶盞多入藥末和勺温湯拌打成蝇頭如常麺煮 治脾疼

くこうし 右一 焙乾搗為細末每服二錢用沸湯點服〇項年周侍 牌疾否僕曰有之渠又云某少年随侍先人任青 郎為婺碎日僕偶謁之渠見僕面有中央之色問 倅後圃粟多且佳日夜飫餐遂成牌疾十餘年時時 作 處拌和匀將片子薑盖面盒二宿夏月一宿 片 的三两 消是刮盖 皮取起裹煨香熟去 皮取 切甘草三两鹽二两 Ī 專治脾疼 湏是刮 普齊か 膜生薑去皮四 爛不 有 研得 44.

多玩四库全書 桃 正脾九家寶 仁散出朱氏 右 大草菓子一箇鑽七孔入丁香七粒用題裹以巴豆 服 發不可忍一日因謁客政疾作急起索湯後得方製 七粒分十四片貼在麵外再以麵裹煨焦亦去麵 與 為細末空心調酒服 一料而 桃仁不拘多少螺粉炒却不用粉 方生 根 P 斷 治脾疼經久諸藥不效者 治男子脚疼不可忍神效

次定四年全島 一 快氣九家寶方 温中九家寶方 右蚌粉先以火煅一次取出研用生薑自然汁浸却 每服十九淡薑湯下不拘時服 巴豆不用取草菓子丁香為末東肉為九如菜豆大 蚌粉四两木香 - 致丁香 - 致陳皮ニ两豆蔻 包火煨候香即出紙去皮以麝香湯嚼下三服瘥 大東七箇每箇約胡椒三粒核桃內一片用温紙 治脾疼 治脾痛 普濟方 主 阖

立安散宏藏 鷄舌香散虫 ヨグビル 右搗為細末每服一錢入塩一捻沸湯點服空心食良薑四兩好油四 治脾受寒濕時發疼痛 前 焙碾前樂共為細末煉蜜為丸如弹子大空心食前 九薑鹽湯下 肉皮 抄 方氏 治脾疼正發服之即 好醋賴火炙令無少用温水洗去原 عد

治脾疼出醫 次定四年全島 10 脾疾軍方出来氏 治 胖疼不問新久 **投積寒冷于中遂感脾疼之疾藥不釋口殊無退** 張忠順盛夏調官都城苦熱食水雪過多又飲木 用荔枝核為末每服二九熱醋湯下 食後 右研為末每發時搖蔥白一 方 ) 類髙良い 普牌方 薑痛 P 並炒藥 散脾 同心 庯 錢熱酒調 Ī 證 瓜

調痛散出 金写中馬と 不復作 吞之若是而已張如所戒明日椒總下腹即脱然更 但 累歲百齊道人道一道人曰我受官人供固非所 取漢椒二十一粒浸於凝盆中一宿漉出以浆水 縮 木香 蓬术 棘柱 砂仁 方垚 丁香 甘草等 治脾疼氣膈 檀香 片薑黄 大香附 生白薑 天麻 白豆冠仁 烏藥 惜

脾痛方出直 ていうこ 右 也 用大草菓二箇去殼到用酒煎痛時服酒能飲 右 以两盏煎 - 剉每服二 細對每服三錢陳米百粒煎服 鷄 心大檳 指出 方直 **盏能飲兩盡以三盏煎兩盏欲其中即** 錢半紫蘇四葉煎服 治脾疼 治脾痛脹湍 椰 良薑等分 苦齊方 舌 盏

治脾痛 治冷物傷脾時作疼痛 多定四库全書 治卒患育胖痛 右為末煎胡椒湯調三錢頂炙盡沸令極熱服 右二味以白酒七升煮取二升分再服又方加半夏 四两湯泡七次洗去滑同煮服 枳殼上熟 巴豆 开為你物傷脾時作疼痛疾亦 括姜寶一枝 菲白 卷二十二十二 半升 細去 末殼 小村草及

とこうこ 治脾胃有蟲食即痛及面黄無疼痛者立效 治脾元氣發至痛不可思者 慢火煨熟酒浸温分三服之 用真珠粉不拘多少研細發時沸湯點二錢忌生冷 **更焦黑為度去茱萸只取桃仁研細次将葱白三莖** 用 以石州燕夷仁二两和麺炒令黄色為末随時米飲 桃仁一两去皮尖两仁者却将吳茱萸同炒取茶 7:1.7 普齊方 荳

射干散也里 多好四库全書 之道路神氣之往来若脾氣壅實則上焦生熱故令 痛心煩口舌乾燥咽喉不利也 大脾胃之氣候於唇口通於咽喉連於舌本咽喉水 射干 赤茯苓 脾實熟咽喉不利附論 す 一两 三分川升麻三分甘草本 治脾實熟咽乾頭痛心神煩渴 石膏二四大青二分歲稅三分黄芩 巻ニナ 剉俣 畧 獨活 穀 頭

たこりえんら 枳殼散患方 熱麺 黄一分薑半分煎六分去滓不計時候温服忌炙傳 右為散每服三錢水一中益入竹樂二十七片生地 絡石三分杏仁雙仁起炒做 西赤茯苓半两川升麻三分射干三分羚角局 甘草 做泰對 麥門冬去心 以做黄石膏二两子苓牛两柴胡二两玄参 治脾實熱咽喉乾頭痛心煩四肢壅悶 皮尖 黄 夫

犀角丸忠す 多定四库全書 去浑不計時温服 右捣為細末入研了藥令勺煉塞和丸梧桐子大每 服竹葉湯下二十九食後服思生果炙煉熱麵 右為散每服三錢水一中盖入竹葉二七片煎六分 麥門冬 半两 犀角屑 馬牙硝冊 龍腦冊 甘草供雨 始 詞梨勒皮半两及木通半两 B. 两 治脾藏實熱咽喉不利舌口乾燥 件旁子\*两射干\*两川升麻三分 基二十 封炎 黄檗

柴胡飲恵す たこり重なら 去浑不計時温服 右為散每服三錢水一中盡入生地黄一分煎六分 行 川大黄件做炒黄茶二分 赤芍藥半两絡石三分甘草料两段川芒硝 恵出方里 两射干 治脾實熟舌本強咽喉不利體重不能 治脾實熱喉中腫痛熱塞不通 普濟方 一两羚羊角骨半两木通 幸 剉丰 两 两

多定四月全書 地骨皮散患力 服忌炙烤熟麺 右為散每服三錢水一中盞煎六分去滓不計時温 川升麻 柴胡 赤芍藥二分甘草其两及射干一两 地骨皮三分麦門冬去心柴胡去两川升麻 去薩杏仁雙仁起炒微黃川芒硝二两三分為及去皮尖川芒硝二两 一两赤茯苓三分玄参三分大青一两 治脾實熱唇腫咽喉不利體熱煩痛 巻ニナ 石膏二两 絡石 龍膽 两

犀角散 てれ フェインエア 右為散每服三錢水一鍾煎五分去浑入淡竹歷半 執 右為散每服三錢水二中盞煎五分去滓入牛旁子 汁一合更煎 牙硝 犀角屑 三分獨活三分黄芩一两川升麻一两 龍膽 治脾實熱舌本强唇口腫咽喉窄塞心神煩 **蘆三** 頭分去 瀘 两左参一两射干一两甘草半两炎 兩須食後温服 馬

氣盛陰氣風則心腹脹滿水穀不消喜噫吞酸食則 **多定四库全書** 吐氣逆霍亂黃瘅心煩不得以腹痛腸鳴時息洩利 以榮華周養身形灌溉臟腑者也若虚則生寒寒則 沈重常多思處不欲聞人聲夢見飲食不足診其脉 脾者位居中央王於四季受於水穀之精氣化氣 細軟弱者是胖虛之候也 合更煎一两沸不計時温服 脾虚冷 y. 陰 四 血

大健脾散 右為末每服三錢水一盏半薑七片素一枚煎七 華澄茄 仁而白术两神麴而厚朴蓝製一的縮砂仁草鳥也去皮解火一附子鄉去皮苗的香雨上甘草 肉豆蔻 青皮 半夏蓝繁檀香 治脾胃虚寒不進飲食 乾薑 白豆兔 丁香西井白茯苓 縮砂仁两一 草

多定四庫全書 補 分食前 白豆蔻三分丁香山泉生具菜英丰两温 脹 良 两二粗五

動 - で 専 車 単 大 変 サ 大 変 サ 大 変 サ 和 胃 皆野ケ 九 梧 桐 蘖 茄 子 製皮順 子大每服 皮电縮 氣 錢炒 丰本赤麻山砂 +石木仁 食前温 脂香 半夏 肉豆 良薑 酒

銀定四庫全書 温氣煮散 右吹咀每服四錢水一盏半生薑五片棗三枚煎 蓋去滓稍熱食前服 青橘皮湯沒去 荆三稜地到莲我术地各藤香 木香 馬蘭花酒 治脾虚心腹刺痛四肢乏力不思飲食 陳橘皮湯沒去當歸切好益智仁去皮 肉豆蔻 好没! 去 庋 甘草及《高良薑炒沉香 梹 柳三枚 河梨勒皮各

胃丹 こうし 附 痰 至六分食前温服 等 痛 逆 進 硃 怯 胷 羅為散每服三錢七水一盖入鹽少許同煎 惡心 泄 **脾藥陰煉成丹平** Telj 弱 痢 膈 鈴 出 痞塞或 飜 不養脾土沖 方永 不 胃吐食臟氣虚寒米 止 類 一應是一 禀 不 新年を 太陰之精不 飲 補 切脚 而 和失布中 脹湍或已食 不借善治真陽衰 胃 誻 穀 經 疾 州虚寒飲 火煅い 不 不 而 問 化 ت/ 男 不 食 虚 腹 消

意下忌猪血一方到如豆大以銀鍋一口用白炒乾每服十粒至二十粒食後人參湯麦門冬湯任 看紅巴上各 南豆蔻 紅豆 良薑 白术 附子此生厚 放牙 改善 胡椒 欽定匹庫全書 婦人皆可服之 成豆蔻 紅豆 良薑 林砂大块者人参 砂仁 **&**1 炒 任 厚 隂

5. 5 補 大陰乾 夜 袋威貯碌砂懸放入鍋內以桑柴火重湯煮四 力 脾肉 豆蔻 淘净焙入 快蜜五斤入前藥一 利 · 食 斤將藥一 BP 欲 九 乳鉢用 吐嘔 惠出 方聖 半同蜜拌匀入鍋内以夾生箱 茅平与 水穀不消或時不 玉 治 槌 半和匀再煮三日三夜 脾氣虚心 研十分細米粽丸蒙豆 腹 脹 ř 利 四 湍 肢 育 無 日 膈 取

欽定匹庫全書 治! 虚 前 右 石約末生薑汁煮蛋肉相, 如豆蔻一两样去皮肉子去皮人参三次人参三次人参三次人参三次人参三次人参三次 脹 温 酒下三十九 脇 力口 根皮 丹参 橘皮 地骨皮痛肩息有時發作悉補之出十 丹参 和斗半蘆分分二臍炮 九灵与當椒 製 梧令祖歸紅石 桐黄皮微半微三角 子大每服 高良 勒 加西白术 二 期 前 梨 勒 食 萬 两二 肉

こう 大理中丸 日再服 右㕮咀以酒四斗漬五七日服七八合加至 食 厚 白术 桂心 甘草 浸粗 治脾虚胷膈 猪 没皮 椒 桔 透生 根皮 梗 芎藭 曹野与 肉 四 桂 痞悶心腹撮痛不思 , 乾地黄 大豪女五 五味子 粗 陳橘皮 甘草 芎藭 縮 浸 附子 飲

大養脚 敏定四庫 全書 鹽 右為末煉蜜丸鷄 涉 香子 白 丁香 九 下 术 四妙 皮去 治脾虚飲食减少肌肉羸瘦 单 两各 黑 厚 附 梹 撥 子 榔 頭 当 卷 皮炮 紅 實大每服一九細 计粗牌裂 石岡 丘 砂 災皮 去 皮去 陳 胡 乾薑地 椒 乾薑 肉 分炮三 焙浸 桂 嚼 去 温 皮 去 胡 訶 粗 酒 或 梨 椒 白

查香湯 治脾虚飲食易傷每至秋夏臟腑一 一两 厚朴皮粗生薑切棗而一半夏四次明明脹虚鳴 一两 厚朴皮粗生薑切棗而一半夏四次明明脹虚鳴 右為末煉蜜丸弹子大每服一丸細嚼温米飲下麦葉 陳春夏草豆 調 及湯上雨卷 氣

水一盏生薑三片 厚三没术飲 煎 祖去皮白

こうし 附子達中湯山醫 右㕮咀 **肉豆蔻 題我附子 地重面色萎黄嘔吐不食** 枚擘破煎六分去滓稍熱食前服右對如麻豆每服三錢鹽水一盏生薑三片粟三 肉豆蔻 題教附子 椒 白术 木香水用 每服四錢水一盏半薑五片豪一枚 乾薑 甘草 事年り 紅 治 麻白豆卷仁 厚切 豆 **脾氣虚寒腹脇脹満身體** \* 浞 两 各 神趣以各丁香 厚朴蓝鬼 利 煎七 胡

分去浑温服不拘時 上夏湯生十 温中下氯治 上夏湯生十 温中下氯治 上夏湯生十 温中下氯治 上夏湯生十 温中下氯治 水子 桂心 橘皮 一大麻 斯 上 **針定四庫全書** 皮西西 生薑 治 脹 温 脾寒語聲憂懼古本捲 **脾養脾升降陽和** 湍 芍藥 白术的附子的甘草 茯苓 三 焦 <u>5</u>

1. 17 ... 1. ... 補 右 更上大一 為 白术 去白微焰 水酒煮囊肉九梧桐子大每服食前生薑湯 台舞り 橘

大温牌 **敏定四庫全書** 温 黄葉 大麦蘖 呉茱萸 桂心 乾薑炮脚九生丁 治久病虚羸脾氣弱食不消喜噫下二十九一方五十九米飲下 右為末蜜丸梧桐子大每服三十九空心酒 丹 附子 地 去 華 當歸 大黄 華神趙 炒黄連 飲 一各 細 任

養脾散 こうしこう 右為末題糊為九梧桐子大每服五十九食前酒飲 更湯洗 桔梗两 陳趙少白茯苓去皮附子皮斯去 甘草《人参 治脾虚不思飲食氣逆泄米較不消 麥蘖以附子此時乾薑地良薑 去皮陳橋皮湯洗 草豆冠去皮蛇藍鸡半麦葉 音率か 白术格二細辛 訶梨勒皮 耄 去葉 煨

一致定匹庫全書 厚朴丸 吐瀉 加生薑两片煎 右搗為散每服一 厚朴去粗皮生赤石脂两半白术 乾薑炮人参 焙 甘草炎 訶梨勒皮地各 白豆冠士女丁香大者 治脾虚内寒外熱宿食不消泄利不止霍亂 錢七入鹽少許白湯點服如中酒 白茯苓止黑當歸切時陳橘皮 卷二十二十二 <u>5</u>. 大麦蘖 炒 浸湯

人参湯 忠智 治 こうこと 昏悶補脾 右到如麻豆每服三錢七水一盏入生薑半分切來 右為末煉蜜為丸梧桐子大每服空心米飲下二十 豆卷去皮各大水 一門子也沒住去担丁香 白茯苓人参而石斛去黄者 陳褐皮的培 桂 治牌虚身重如石食少腹脹腸鳴精神 白族養去黑地 白

**敏定匹庫全書** 柯鬥 呉茱萸丸 砂煎丸 脇 三枚擘破煎六分去滓稍熱服不拘時忌生冷油膩 心空入茱萸在内以盖覆之用黄沉園裏溏灰火内 心面黄痿弱用具茱萸四兩陳者用大菜菔一枚 熟煅取出别用慢火以醋炒令匀熟用葛布袋盛之 脹淌不思食五上心疼痛颗冷 麵 治脾元虚冷宿食不消心腹刺痛嘔逆醋 治 牌虚心腹滞氣發渴疼痛自膈痞悶两 剜

補 てこうこ 破 右搗篩每服三錢七水一盏生薑三片切棗二枚擘 牌湯 每日空心米飲下七粒久服永無冷疾 力 同煎六分去浑食後温服 厚 培各丰两人为浸去白 去粗皮 治脾不足心腹脹湍痛食則欲嘔四肢少 香 浞 透生 吳茱萸先炒一分 桂 白术 戊去 皆存す 粗 白豆冠 訶梨勒及士 髙良薑 两核當歸 陳 七刀 橘 焙

白豆冠湯 安中湯 多定四库全書 擘煎至六分去滓不計時稍熱服 右剉如麻豆每服三錢七水一 澄茄飲 陳橋皮 白豆冠去皮 丁香 退出方百 百 治脾臟久虚積冷不散及陰氣傷寒喘悶 **两各** 二 烙各一两厚朴汁炎二两甘草分 乾薑湯浸去白厚朴去粗皮薑甘草及三乾薑 治脾虚不進飲食 治脾胃一 白术 一切疾 盏薑三片棗子 芎藭 万見 胃類 本 是 齊門 白茯苓 安 理 散脾 枚 黑

13. 7 ... 2... 補 牌湯出醫方 右到如麻豆大每服三錢七水一盏薑三片塩半錢 頄 堅服四肢 厥 華澄茄 艾葉同煎六分去滓稍熱空心服 沉香 不得取腸鳴虛脹飲食不消勞倦虛羸喜噫四肢 青橘 柯 附 湯 治脾虚寒病泄瀉腹湍氣逆嘔吐心 焙浸 子 語解む 盆智 陳實 分皮 肉浸 山茱萸粒懷香 天 雄 庋 臍

官桂各一甘草的二 草集 照縮砂仁 趙胖湯 進方 古為對散每服四錢水一盏半煎七分去浑食前人参 茯苓 草葉皮乾薑 地名麦藤炒甘草及 逆冷多以少起情意不樂 欽定四庫全書 服

てこうに シュー 豆蔻湯 右對如麻豆每服二錢七水一盏半入蜜一 飲下四五十粒 右為末煉蜜和杵三二百下九梧桐子大食前鹽米 分去滓温服不拘時 蘖炒白术两一肉豆蔻三皮附子皮麻 甘草 豆兔生用人参 治脾虚脹悶喘息不匀涕哦稠粘不思飲食 白茯苓去黑陳橘皮湯浸去 音なる 一起頭煎

補 多定匹庫全書 白术湯出聖 麺 右 下痛補脾 枚擘破煎六分去滓稍熱不拘時思生冷油腻 **剉如麻豆每服三錢七水一盏入生薑半分** 白术 詞梨勒散息す 两半 桂 皮相高良薑 五味子 Ņ 治 脾虚下焦冷育中淌悶不思飲食育 白芍藥 治脾氣虚大腸下洩腹痛不思 熟乾地黄后各 甘草 附子略地 訶梨勒皮 梨 皮 濕 两

補 とこうえ こよう 脾白豆蔻散出 去浑不計時稍熱服 右為散每服三錢水一中意畫半分東三枚煎六分 少思飲食 本香半两編砂三分野科三分去粗皮金片 可梨勒井两根草豆 食飲四肢少力 草豆蔻三分陳橘皮半 治脾氣虚食飲難消腹脅氣脹 香野方 生甘草一分灸當歸三分 菰两 焙汤 浸 剉 去

橮 柳散出す 樂 橮 子並用人参 茯苓 陳麹 治脾寒飲食不消倦氣脹噫消憂愁不

五加酒金 ここう とここ 兩半 右㕮咀以清酒二斗清三宿一 右治下節食後酒服二方寸七日再服 傷 茰 <u>5</u>. 加皮 麦蘖 杜 枸 治内虚坐不安席好動主牌病寒氣所 白水的 内各 杞子 乾薑 升 乾地黄 きなっち 内 服七合日再 附子 三两 方用橘皮 石膏

与水半斤去租皮生墨牛斤青州東四两水 厚朴甲煎水畫為建去生養東細對蛤 白水散出干 治脾虚不能飲食不暖 白水散出干 治脾虚不能飲食不暖 白水散出干 治脾虚不能飲食不暖

.... 華撥丸 治脾虚嘔逆心腹痛面色青黄腰胯冷痛 右為末煉蜜丸梧桐子大每服空心粥飲下十九日 的到梨勒皮 # 两厚朴 法制成 生 董 華撥 木香 附子 她聚去 胡椒 桂去 粗 乾薑 右搗羅為散每服二錢 空心温酒調下日三一方白茯苓皮黑麥蘖以芎藭 陳麹三两 加大腹橘皮 許断方 陳麹以西 去祖 乾薑

一致定匹庫全書 六君子湯 豆蔻九豆鬼 不得者 内虚鸣频雕藏冷氣 右為末煉蜜九梧桐子大每服二十九早晚食前服 蜀椒上日并合甘草、百 陳麹以乾薑 白术的一桶红 九草 腹 治脾臟不和不進飲食上燥下寒服熱藥 四九 积稅 治脾久虚不下飲食痰逆惡心本 卷二十 MANAGE AND ASSESSED. 起去 妙粮 半夏以枳殼炒 附子皮斯去 麸

快 脾飲子 半煎八分去滓空心服 右㕮咀為散每服四錢生薑十片東二枚水一大盏 七分去滓温服不拘時 右攻咀每服四錢水一盏半生薑七片素兒一枚煎 連皮草菓 厚朴五两三分 丰两 災各 甘草民附子地去陳皮五四各 皆称な 良薑

訶梨勒湯 一多 安四庫全書 烏藥沉香丸 飲下 右為末煉蜜九梧桐子大每服五十九食前温栗米 腹痛進飲食 華澄茄錢 訶梨勒 烏藥判沉香 五煨 治脾虚不思飲食温脾内補 治脾脹悶嘔逆惡心順三焦化滞氣定 厚朴 剉 胡蘆巴炒白芷西半 计员选三分人参去 粗皮生薑人参 木香 乾薑地

厚朴九 温中丸 欠己日年公司 米飲亦得 右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十九空心薑湯下 右粗捣篩每三錢七水一盏煎六分去浑空心温 白术 日再 當歸切時白茯苓去異皮 治脾虚腑腹疼滑泄不利不思飲食 治脾咳惡寒口中如含霜雪中脘冷痛 乾薑 半夏西一 昔済か 細辛 胡椒 學 錢各 五 服

- 基橋丸 金分四月百十十 在為細末類糊力 薑湯熱水任下不拘時 右捣為末醋者超糊九梧桐子大每服二十九至三 十九空心米飲下 **河科勒皮**州 焙收切 丸梧桐子大每服三十九至五十九 分版 :+ 乾醬地二附子地 陳皮去白飯 神 妙二两 脐裂 £ 白术。

大三日面 二十 附子湯 麻豆散 治脾脏虚冷哭减少食後氣脹自中氣隔於其脉右手 三片煎至六分食前去洋温服 右對如麻豆每服二錢水一盡入棗二枚擘破生 右為末米飲和服一合日四五任情多少 附子炮製去 大黄豆二升升麻子三升炒 治脾虚 主牌氣弱不下食餌以此當食 人参等分 哲商な

金丘四月至書 治 脾職虚冷中焦冷延隔聚非時間身體寒與食减少 關脉微細大腑虚冷宜喚此方 但喫物即覺在心前隔住不肯通透非時忽覺心前 淖任意喫 右件細杵羅為末每服二錢水一盏煎取八分澄去 吳茱萸 皮 丁香 各半 炣 獨 肉豆蔻 活 藿香 二; 十: 訶子 川芎两各 桃 把葉刷去甘草 厚 朴養及黃橘

大小田二 ノエラ 是肝熱刑脾也 冷痛 厚朴半夏候水乾去半夏不使更将厚朴净水內淘 分空心學須是唇皮無色面黄方學若唇皮赤色 两次焙乾同聚藥杵羅為末每服二錢水一蓋煎八 右先挺生薑三两用水三升攪取汁净布濾過用煮 甘草 肉豆蔻 草豆蔻两半夏 藿香 人参 普齊方 防風 木香\* 桔梗 厚朴皮田 川芎 即

沉香散五氏 多定四库全書 治 服 右為末每服二大錢水一盏煎至七分不計時候温 牌職傷冷少思飲食腹齊脹湍食即氣隔常多區逆 進食和氣 **一别** 两研 沉香 , 乾薑 地裂 青橘皮去的豆蔻 木香 治脾元氣不和中焦痞悶氣滞噎塞 各 陳橘皮去白 卷二十 檳榔 人参 的桂去皮 郁李仁 去酒 甘 皮浸

とこう シートラ 治脾臟温邪所勝相刑於腎方母故 服 右為末每服二大錢水一 亦唾不止命 草豆蔻 阿 魏焙用 各丰 两 姜汁災 乾打 木香 用東屯盖我二 蘕 黄橘皮 普齊方 桔梗 盏煎至七分不計時候温 甘草 藿香四珠 訶子 川芎 火炮 分枝甘草 野九 肉豆蔻 黄橘

多玩四库全書 麋臍九家藏經 昔王東鄉運使出蜀過鄂但飲酒不能食肉林總那 以此方三服而能啖 右為細末用肉蓯蓉打糊為丸每服七十粒温 浑 右細杵羅為末每服二錢七水一盏煎八分空心去 服 麋茸 茯苓 防風 温内解等分 治脾虚 吳茱萸 羌活分等 酒 傅

たこうこ シュラ 187/ 內搏於足太陰之經伏留而不去脾積冷氣攻於心心 氣與邪氣交爭上下相擊故令心腹疼痛也 夫臟腑氣虛脾胃衰弱陽氣不足陰氣有餘邪冷之氣 半两和匀碾為細末白湯調下不拘時候頻服有效 拌生好片上雪黏飽足然後焙令乾拜五兩災甘草 **熾惡心不思飲食用生薑不拘多少和皮切作片子** 脾臟冷氣攻心腹疼痛 治脾寒氣滯疼痛不堪胃膈痞悶嘔 善癖方

沉香丸 多定四库全書 莲莪术 桃仁生皮尖 剛妙湯飛過肉

こ、ラー ニー 国 內豆養丸 治脾胃虚弱冷物積滞臍腹撮痛飲食無右為末煉蜜丸鷄頭實大丹砂為衣温酒嚼下一丸 西赤石脂二两桃仁二十枚去皮白术 白茯苓 肉桂去粗黄芩土黑乾薑物果如豆蔻二枚荆三稜煨出各人参 天雄炮鬃去 味 五去 两粗皮 半裂

疼痛嘔逆不思飲食四肢羸瘦京三稜九 地里 治脾臟冷氣及 多定四庫全書 飲下 右為末爛栗米飯丸梧桐子大每服三十九空心米 计炎令香熟 乾薑半四地 吳茱萸 与情就做大粗皮涂生量 乾薑半四地 吳茱萸 半两沿没川大黄 半两剑 當歸 半两到赤茯苓 半两厚朴京三稜 地到 驚甲 炙去裙糊 木香 半两白术 治脾臟冷氣及夙有積塊時攻心腹 乾薑半两也 部科勒三分根

華澄茄湯 ここフ・レーニラ 厥冷嘔吐痰逆不下飲食 右為未蜜和九梧桐子大每服不計時候生薑橘皮 下三十九 東五味子做炒巴戟天士心肉桂皮粗白木 芎華澄茄 沉香到石斛士根各人参 赤茯苓生 木香分 肉豆蔻去般附子吃縣 没藥各 兵椰半两附子 一两电裂 治脾臟冷氣攻心腹疼痛悶亂煩惧手足 善齊方

一多定四库全書 麝香華澄茄九 霍亂嘔吐臟腑滑利膈院痞塞不思飲食 右到如麻豆每服三錢七以水一盏入生薑三片東 二枚擘破煎七分去浑食前温服 澄茄 麝香 半两硫黄 三分石砂細研一分石斛去根 丁香 懷香子以補骨脂以木香两一何首鳥 肉豆蔻 治脾臟冷氣攻心腹撮痛手足逆 内桂去粗當歸切時吳茶 冷

京三稜散 治脾臟冷氣攻心腹痛或脅下氣聚不散 とこう。 A. とう 面色萎黄手足常冷不欲飲食 服 子大每服二十九至三十九温酒下米飲亦得空心 右搗羅十二味為末入研藥拌勺酒煮麺糊九梧桐 焙乾炒酱浸七遍 京三稜山两白术一两桂心半两 半两芎醇三分枳後三分起炒人 檳榔 普府方 青橘皮一两沒去 至

訶梨勒九 金好四月全書 不計時服 肢無力 右為散每服三錢水一中盛入東三枚煎六分去滓 時 後 機 妙 遊 歸 是 司梨勒用皮 人参去蘆桂心半两乾薑彩料 檳 柳三分附子一两炮裂 乾薑三 治脾臟積冷氣攻心腹疼痛不能飲食四 炒厚木薑汁炙分對厚小一两去 **令粗** 香皮 熟金 剉分 生 灺 吳菜 英半 做 两半 做 两 炮

CLIPL JII 乳香丸 肠化痰涎和脾胃止冷利香丸 治脾胃冷氣心腹刺痛散滞氣消酒食利 右為散煉蜜和九梧桐子大每服不計時温酒下三 檳榔一两陳橘皮半两湯沒三核半两附子一两炮製去 檳榔一两陳橘皮牛两湯沒厚朴上薑汁炎今三核牛两附子一两炮裂桔梗一两齿解炒肉白皮上 當歸一两白茯苓一两木香半两向豆蔻三枚胡椒半两 \$ 胸 香注

北西川州村西北温河或蓝湯下 北京 一大五九温河或蓝湯下 我看明沉香到没藥研木香 丹砂研积股土 我看明沉香到没藥研木香 丹砂研积股土 我看明沉香到没藥研木香 丹砂研积股土 我我是我们的一两半水雅去砂石楝霞肉四两為一个大或十五九温河或蓝湯下 沉香丸 多定四牌全書 沉香两月 治脾臟冷氣攻心腹痛不思飲食 芍樂、益智仁 厚朴云粗皮生

Callona Litin **向豆冠散出里** 常多嘔逆四肢虚 鹽湯下不拘時 右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九炒生薑木瓜 切豆鬼三枚 甘草分半一 炒木香 皮 乾薑 地江豆蔻去皮白茯苓去其 白术丰四木香 治脾臟冷氣時攻心腹痛面色青黃 當歸切好檳 当山か 柳州附子处裂去 歧

銀行四库全書 不和見食即嘔面色萎黄四肢無力 治脾脏久積虚冷氣攻心腹脹痛胃氣 中两乾薑汁两也厚朴意汁及全香熟地製去芎藭井两當歸三如對甘草也如果丁香半两青橘皮去白狼時遂我术半两丁香半两青橘皮丰两湯浸蓬我术半两 阿魏熟為度 檳 椰 青橘皮湯沒去 Ń 分

戎鹽丸 てこうえ シリ 飲食寬心胸化留飲 酒下 右為末煉蜜和九梧桐子大每服二十九不計時熱 戎鹽 麝香細研分 人参士蘆乾薑地影莲莪术 治脾胃寒冷氣攻心腹疼痛痰逆惡心不思 **華**撥 檳榔 青橘皮湯浸去 白豆冠去皮桂心 普解方 肉 訶梨勒是用皮已 桂 附子皮地 益智 卖 皮

銀定四库全書 砌 砂煎九出聖 **育膈不利两脅脹淌不能飲食** 右為末麺糊九菜豆大每服二九食後用生薑湯下 更以意加减 棟實 香 丁香 木香 細不研央 蓬莪术 \*西巴豆霜 J 治脾臟冷心腹有積滯氣發歌疼痛 胡 阿魏 极多 附子皮胖去 陳麹為木 白芥子 內豆蔻去殼墨丁 訶梨勒 **藤香子** 各一两 去核

とこう これり 丁香散 梧 攪令勺慢火熬成膏和諸藥入臼內杵数百下九如 次入阿魏同煎五七沸後以綿濾過再熬後下麹末 右自訶梨勒以下同搗為末以好酒一升先煎硼砂 酒亦得一方無沉香 桐子大每服十五九至二十九食前生薑湯下温 檳 丁香 柳当青橘皮为浸去 治脾臟冷攻心腹切痛思飲食定嘔治鴻利 白茯苓皮 厚朴薑汁炙 普齊方 沉香当各 京

厚朴丸 多玩四库全書 肌 留滞藏腑面色萎黄四肢少力氣出多寒手足逆冷 店問痰逆惡心嘔吐水腸泄寫不思飲食雖食**遲化** 體羸瘦 搗羅為散每服二錢七空心米飲調下 草災對各著术三分 地裂乾薑 此西吳茱萸的沒焙 才盖汁炎 治脾臟冷氣攻心腹多疼痛脇肋虛脹胃膈 薑汁炙 肉豆冠去般附子雌裂去去粗皮生肉豆冠去般附子雌裂去 卷二十 肉豆蔻去散 甘

附子丸 治久病脾臟虚冷飲食不下心腹疼痛面黄 Calloral Litin 香生薑湯下空心如飲食稍化遲停滯貿膈不計蒸東內丸梧桐子大每服五九至七丸煎陳橘皮 右除巴豆外搖末合研勾以囊肉膏和劑如硬量加 軟碎生薑 自 如 两 一 分 四 两 河 通 明 者 椒 利去皮核研鳥頭不用自然汁慢火同类今透分巴豆油取霜一方大去 皮去 粗 替齊方 一方大東二西實白膜出大東三十枚鳥 各 者頭

木香散出聖 木香散出雪 治脾臟冷氣攻心腹疼痛或吐清水不柱滴水丸梧桐子大每服二十九空心米飲下石為末以酒一升煮盡焙乾以炊餅末三两一處和附子生皮脾湯浸透切木香 硼砂洗去砂石 熬 郵定四庫 全書 浮腫滑泄白利 思飲食 白木三分肉桂 木香半两人参三的芎藭三分青橘皮二 两脇 ·做皮大 脹\* 附子去皮脐當歸三分

紅豆蔻散出聖 又腹脇脹悶不思飲食 右為散每服三錢水一中盡煎六分不計時稍熱服 附子去皮臍 陳橘皮士白格 白术半两菌 一两芎藭三分可梨勒用皮 草豆蔻大 紅豆蔻一两木香丰两當歸 吳茱萸遍時乾微炒 去皮厚朴薑汁炎五枚厚卜二两去 治脾臟冷氣攻心腹疼痛宿食不消 人令香熟 微村北半两高 髙良薑 枚 土

華授九出生 多定四庫全書 時稍熱服 黄四肢無力不思飲食 右為散每服三錢水一中蓋入東三枚煎六分不拘 今香了户三分到了了一年两地可见力一两根用一两附子去皮脏 胡椒三分厚朴金生薑汁沒車撥三分木香丰两桂心丰两白茯苓三分槟榔 炒三分黄微 然 當歸以 草盖梨到 可教前令者當歸三分到乞盖半两地可教前 治脾臟久積冷氣攻心腹疼痛面色青  我壓油盡研成霜 好壓油盡研成霜 好壓油盡研成霜 白豆蔻去放青橘皮的烙 胡椒 丁香丸 右為末煉蜜和丸梧桐子大每服不計時粥飲下三 人参廣頭 )出王氏 去 治脾臟冷氣攻心腹疼痛及女人 血

抵聖九 多定四年全書 綿灰半錢酒調下十九心痛煎鹽醋湯下七九女人 糊九恭米大再用砂為衣五九茶酒任下治元氣用 右將檳榔以上先為末次入餘三味和匀用醋煮麵 血氣當歸酒下五九此藥大妙服有神效 阿 木香半两丁香火十乳香研蒔蘿分炒檳 治脾臟冷氣攻心 砂分 石湯 靴杜桂 皮去 粗 **肉豆兔去放車撥** 

鹽煎散 てこうし シド 鹽湯下温酒亦得 久冷 丸食後生薑鹽湯下如痛服七丸內嚼三九焼生薑 右為末用粳米飲或飯丸如菜豆大每服三九至五 烏頭 棟實之枚陳橘皮湯浸去白 治脾臟冷氣攻臟腑不調心腹撮痛及下 裂去皮腳 懷香子以附子 語陈方 半两 三 木香 去皮臍各一水没三日炮 两裂 碙

多好四库全書 右搗羅為散每服二錢七入生薑鹽少許沸湯 温 右搗為散每服一錢七水八分鹽煎四分空心和 か木香 京三稜 出聖 治脾臟氣虚風冷東之正氣相繫心腹疼 溥切温以 白茯苓去黑 甘草災對 治脾臟冷氣攻心腹疼痛不可忍 碎焙乾炒青橘皮去白水浸冷顿青橘皮去白 卷二十 黑豆黄炒陳橘皮 各炒分汁

沉香湯 香湯 治脾虚不思飲食冷氣攻腹肠四肢少力吐右搗羅為散不計時熟酒調下一錢 酸 做此青橘皮士白孤始 有人 髙良薑 沉香 水 术一两當歸, 的乾薑豆分地 木香 并两桃仁生 桂 檳榔到吳茱萸湯沒一宿厚北桂皮粗白豆裝士成各青橘皮井 柳二颗柱心一两莲莪

幣甲煎丸 **欽定四庫全書** 拘時 臍下撮痛 右粗搗節每服三錢七水一盏煎六分去滓温服不 右除碉砂巴豆外為末巴豆膏同拌匀水煮麺糊 各一两京三核地到巴豆四月醋一井同然成炒埋重京三核地到巴豆二钱去皮心研細與鳖甲醋炎去 酮砂不失芫花酯拌狼毒碎判乾 治脾臟久積冷氣攻心腹痛胀惡心嘔逆 青研涤

集聖丸 てこう これ という 吳茱萸散恵す 熱服 疼痛 右為散每服三錢水一中盡煎六分去淖不拘時稍 墨汁及全香熟 當歸做炒木香半两二两去粗皮塗生當歸半两到木香半两具来更遍暗乾做炒高良薑半两桂心三分厚朴 **蒙豆大每服一丸食後生薑鹽湯下** 治脾胃氣不足風冷乘之與正氣交擊心腹 治皮臟冷氣攻心腹疼痛不可忍 普解す

舒定四库全書 吳茱萸丸 滓服 右為末醋煮麺糊丸梧桐子大每服十五丸生薑湯 右到如麻豆每服三錢七水一盞鹽一捻煎七分去 附子炮製去 吳茱萸為炒七桂去粗皮陳橘皮湯沒去 两剉 治脾胃冷氣心腹脹 桂 **庆去** 乾薑地甘草及對 卷二十 華澄茄 梢 榔

児薑九 出和 VALIDINA ZI LIN 右用大附子五十箇各重半两去皮臍以尖刀剜去附子 确砂 木香 生薑分等 末以水為丸如鷄頭復以生薑一塊學作两片以藥 附子用文武火煨令黄用木香如附子之半同為細 痛冷積水脾結聚疼痛一切冷氣等疾 心子約容确砂半錢實之却以附子未麺作餅子裹 治本臟虚飲食不化或成癥癖或發心 普濟方

**呉茱萸湯** 多好四四日全書 人参冲和九出杨氏 前一方用酒煎 用吳茱萸湯浸焙炒三兩每服一分不摶以水二盏 在内温纸裹 煨 候 令熟白渴嚼空心服 人生薑一分切葱白五寸切同煎八分去滓温服食 不進飲食兼因傷冷作渴並皆治之 人参去蓝白术 治脾臟虚冷心腹疼痛 す 大麦蘖以陳橘皮 治脾經受冷心腹疼痛嘔逆中 人出白乾薑

出えるうえくに 治中湯此种藥 砂仁各半两 嚼濃煎棗湯下食前常服大進飲食消穀散滯每服 右件為末細煉蜜為丸每一兩作一 食大便溏泄不因傷濕者可去青橘皮加肉豆蔻縮 九水一盏煎七分温服亦得如脾胃虚弱不進飲 甘草及己四青橘皮为这种麹气味和 生白人参去廣甘草民白木 | Ka 治脾胃冷氣貿膈不快腹痛氣不和 哲解す 十九服一九細 陳皮士 字 白

